

TYPY BADAŃ ZE WZGLĘDU NA CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK BADANIA

I. TYP BADAŃ – do 30 minut od pobrania materiału biologicznego:

1. Morfologia krwi bez rozmazu mikroskopowego
2. Mocz badanie ogólne
3. Gazometria
4. Jonogram z krwi pełnej – Na, K, Cl
5. Wapń zjonizowany
6. Poziom glukozy
7. Prokalcytonina
8. Rotawirusy
9. Adenowirusy
10. Troponiny
11. CRP w surowicy

II. TYP BADAŃ – do 60 minut od pobrania materiału biologicznego:

1. CRP w płynie mózgowo-rdzeniowym
2. Płyn mózgowo-rdzeniowy /bez rozmazu/
3. Mocz z osadem
4. Fosfor, wapń, magnez
5. Koagulogram – PT, D-dimery, Fibrynogen, Antytrombina
6. Campylobacter spp
7. Clostridium difficile (toksyny A i B + dehydrogenaza glutaminianowa)
8. Helicobacter pylori
9. Lamblia (Giargia)
10. RSV
11. Streptococcus pneumoniae – antigen
12. Odczyn Paula – Bunnela
13. Meningotest
14. NT Pro BNP
15. Mocznik
16. Kreatynina
17. Amoniak w surowicy krwi

III TYP BADAŃ– do 120 minut od pobrania materiału biologicznego:

1. Albuminy
2. Alat
3. Aspat
4. Bilirubina całkowita w surowicy krwi
5. Bilirubina bezpośrednia w surowicy krwi
6. Kreatynina
7. Diastaza w moczu
8. Fosfataza alkaliczna
9. GGTP
10. Cholesterol całkowity
11. Trógllicerydy
12. Lipidogram

13. Żelazo w surowicy
14. TIBC
15. ASO
16. RF
17. Kwas moczowy
18. Kwas mlekowy (mleczany)
19. Płyn mózgowo-rdzeniowy z rozmazem
20. OB
21. Grupa krwi

IV TYP BADAŃ – do 4 godzin od pobrania materiału biologicznego:

1. Morfologia krwi z rozmazem mikroskopowym
2. Proteinogram

V TYP BADAŃ - do 24 godzin od pobrania materiału biologicznego:

1. Plwocina na BK -preparat bezpośredni

VI TYP BADAŃ - do 48 godzin od pobrania materiału biologicznego - 2 razy w tygodniu:

1. Badanie epidemiologiczne pacjenta przy przyjęciu: wymaz z gardła; z nosa; z odbytu
2. Posiew moczu
3. Testy ELISA:
 - B. pertusis - IgG
 - B. pertusis - IgM
 - B. pertusis - IgA
 - Ch. pneumoniae - IgG
 - Ch. pneumoniae - IgM
 - Ch. pneumoniae - IgA
 - Ch. trachomatis - IgG
 - Ch. trachomatis - IgM
 - Ch. trachomatis - IgA
 - M. pneumoniae - IgG
 - M. pneumoniae - IgM
 - M. pneumoniae - IgA
 - Yersinioza - IgG
 - Yersinioza - IgM
 - Yersinioza - IgA
 - Pneumocystis carini (metodą immunofluorescencyjną)

VII TYP BADAŃ - do 72 godzin od pobrania materiału biologicznego:

1. DDO (plwocina, wydzielina oskrzelowa)
2. BAL ilościowo
3. Cewnik naczyniowy ilościowo
4. Aspirat oskrzelowy ilościowo
5. Sporale
6. Wymaz z gardła
7. Wymaz z ucha
8. Wymaz z oka
9. Wymaz ze skóry
10. Wymaz z pępka
11. Wymaz z pod napletka

12. Wymaz ze sromu
13. Płyn mózgowo – rdzeniowy
14. Testy ELISA:
 - Borelioza - IgG
 - Borelioza - IgM
 - Cytomegalia - IgG
 - Cytomegalia - IgM
 - EBV - IgG
 - EBV - IgM
 - Parvovirus - IgG
 - Parvovirus - IgM
 - Toksoplazmoza - IgG
 - Toksoplazmoza - IgM
 - Toksoplazmoza - IgA

VIII TYP BADAŃ - do 96 godzin od pobrania materiału biologicznego:

1. Kał (S-S, Yersinia, inne)
2. Kał (S-S),
3. Kał – EPEC
4. Ropa, odleżyna
5. Badanie czystości bakteriologicznej sprzętu
6. Kontrola jałowości powietrza (komora laminarna)
7. Elastaza trzustkowa
8. HCV Ab
9. HBs Ag
10. HBs Ab
11. HBc Ab
12. Diagnostyka gruźlicy:
 - Quanti feron - TB

IX TYP BADAŃ - powyżej 96 godzin od pobrania materiału biologicznego:

1. Kał – badanie ilościowe w kierunku drożdżaków
2. Badanie w kierunku dermatofitów
3. Diagnostyka gruźlicy:
 - MB Bact
 - Quanti feron – TB
 - Plwocina - posiew
 - Popłuczyny żołądkowe - posiew
 - Lekooporność wyhodowanych prądków gruźlicy

X TYP BADAŃ - do 168 godzin od pobrania materiału biologicznego:

1. Neuropanel kompleksowy
2. Panel alergenów pediatrycznych
3. Panel alergenów wziewnych
4. Panel alergenów pokarmowych

oraz pozostałe badania niezbędne w zakresie diagnozowania hospitalizowanych pacjentów i ambulatoryjnej opieki